

2016年10月3日

各位

興和株式会社
興和新薬株式会社

胃もたれ・胃痛・むかつきに！

キャベジンコーワα顆粒 新発売

～弱ってきた胃を元気に動かし、正常な胃の働きを取り戻していく総合胃腸薬！～



興和株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：三輪芳弘）は、1960年発売当初より配合しているMMSC（メチルメチオニンスルホニウムクロリド）に、生薬成分ソヨウなどを配合した顆粒タイプの総合胃腸薬「キャベジンコーワα顆粒」（第2類医薬品）を、全国の薬局・薬店、ドラッグストアなどで、2016年10月3日に新発売いたします。

「キャベジンコーワα顆粒」は、荒れて傷んだ胃の粘膜を修復し、正常な状態に整えるキャベジン本来の効き目に加え、胃の運動を促進する生薬成分ソヨウなどにより、弱った胃の働きを取り戻していく胃腸薬です。「キャベジンコーワα」の顆粒タイプで、爽やかなシソ風味となっており服用しやすくなっています。また、毎食後1日3回の服用で胃が元気に働くようになり、胃の不快な症状にすぐれた効果をあらわします。携帯に便利な分包タイプですので、外出先での不快な症状にも対処することができます。

■キャベジンコーワα顆粒 特長

- ・「キャベジンコーワα」の顆粒タイプの製品です。胃粘膜を修復するMMSCに加え、健胃生薬ソヨウ乾燥エキスが協力して働くことで、弱った胃の働きを元気にしていきます。
- ・荒れて弱った胃の粘膜を修復するMMSCが1日量150mg配合されています。
- ・リパーゼAP12は脂肪を分解する酵素で、消化機能を助ける効果があります。
- ・爽やかなシソ風味で服用しやすくなっています。
- ・携帯に便利な分包タイプの胃腸薬です。

■製品概要

製 品 名	キャベジン [®] α 顆粒		
分 類	第 2 類医薬品		
成分・分量	本剤は、3 包中（成人 1 日量）に以下の成分を含有しています。		
	成分		分量
	胃粘膜修復剤	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	150.0mg
	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	700.0mg
		炭酸マグネシウム	250.0mg
		沈降炭酸カルシウム	1200.0mg
		ロートエキス 3 倍散 （ロートエキスとして 30.0mg）	90.0mg
	健胃生薬	ソヨウ乾燥エキス （ソヨウとして 270.0mg）	30.0mg
		センブリ末	30.0mg
消化酵素	ビオチンアスターゼ 2000	24.0mg	
	リパーゼ AP12	15.0mg	
効能・効果	胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重		
用法・用量	下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。		
	年齢	1 回量	1 日服用回数
	成人（15 歳以上）	1 包	3 回
	11 歳以上 15 歳未満	2/3 包	
	8 歳以上 11 歳未満	1/2 包	
8 歳未満の小児	服用しないこと		
容量・価格	容量	希望小売価格（税抜）	
	12 包	650 円	
	28 包	1,400 円	
発 売 日	2016 年 10 月 3 日		

製品サイト URL	http://hc.kowa.co.jp/cabagin/
製品のお問い合わせ	
興和株式会社 お客様相談センター	TEL:03-3279-7755
その他のお問い合わせ	
興和株式会社 広報部	TEL:03-3279-7392

「キャベジンγα」のトライアルサイズがリニューアル！

キャベジンγαの
**トライアル
 サイズ** 18錠 **が生まれ変わる！**



「キャベジンγα 顆粒」の発売と同時に、「キャベジンγα」（第2類医薬品）のトライアルサイズ（18錠）の包装をプラスチックボトルにリニューアル。これまで以上に持ち運びが便利になりました。新規ユーザー向けのトライアル品としてだけでなく、既存ユーザーの携帯用としてもお使いいただけます。

製 品 名	キャベジンγα		
分 類	第2類医薬品		
成分・分量	本剤は、6錠中（成人1日量）に以下の成分を含有しています。		
	成分		分量
	胃粘膜修復剤	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	150.0mg
	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	700.0mg
		炭酸マグネシウム	250.0mg
		沈降炭酸カルシウム	1200.0mg
	健胃生薬	ロートエキス3倍散 （ロートエキスとして30.0mg）	90.0mg
		ソヨウ乾燥エキス （ソヨウとして270.0mg）	30.0mg
		センブリ末	30.0mg
消化酵素	ビオチンアスターゼ 2000	24.0mg	
	リパーゼ AP12	15.0mg	
効能・効果	胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重		
用法・用量	下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。		
	年齢	1回量	1日服用回数
	成人（15歳以上）	2錠	3回
	8歳以上 15歳未満	1錠	
8歳未満の小児	服用しないこと		
容量・価格	容量	希望小売価格（税抜）	
	18錠	600円	
発 売 日	2016年10月3日		