

2024年10月2日

各位

興和株式会社

荒れて傷んだ胃粘膜を修復し、弱ってきた胃を正常に戻していく

**キャベジンコーワαプラス 新発売**

興和株式会社（以下、興和）は、胃粘膜修復剤のMMSC（メチルメチオニンスルホニウムクロリド）を配合した胃腸薬ブランド「キャベジンコーワ」から、健胃生薬の「コウボク」を新配合\*した「キャベジンコーワαプラス」（第2類医薬品）を2024年10月2日に新発売いたします。

- 胃粘膜修復剤 MMSC 配合。荒れて傷んだ胃粘膜を修復し、弱ってきた胃を正常に戻していきます
- 制酸剤の組み合わせを変更\*。過剰な胃酸分泌を抑え、出過ぎた胃酸を中和します
- 弱った胃の働きを元気にする健胃生薬「コウボク」を新配合\*

「キャベジンコーワ」ブランドは1960年に食べ過ぎ・飲み過ぎなどによる胃もたれや胃の不快感を改善する胃腸薬として誕生して以来、社会環境や時代のニーズに合わせて製品改良を続けてきました。


今回、新発売する「キャベジンコーワαプラス」は、「キャベジンコーワ」ブランドの特長成分である胃粘膜修復剤 MMSC に加え、新たに制酸剤の水酸化マグネシウムを配合し、制酸剤の配合量・組み合わせを変更\*して、過剰な胃酸分泌を抑え、出過ぎた胃酸を中和します。

\* キャベジンコーワαと比較

さらに、芳香性健胃生薬の「コウボク」など、3種の健胃生薬を配合し、胃粘膜が薄くなってバリア機能の低下した胃の働きを元気にしていきます。

ストレスや食べ過ぎ・飲み過ぎ、加齢による胃の衰えなど、胃の不快症状の要因は多岐にわたります。興和は「キャベジンコーワ」ブランドを通じて、胃の不快症状に悩む生活者のQOL向上をサポートできるよう、より一層努めてまいります。

## ■ 働きのメカニズム



※ キャベジンコーワαと比較して水酸化マグネシウム、コウボク乾燥エキスを新配合

## ■ MMSC とは

MMSC (メチルメチオニンスルホニウムクロリド) は、生のキャベツ汁から発見された胃粘膜修復成分で、以前はビタミンUといわれていました。MMSCは胃の血流量を増加させ、胃粘膜を修復・保護する作用があります。

なお、「キャベジン」のネーミングは、「キャベツ-イン (cabbage in)」を語源として命名されました。

## ■ こんな方におすすめします

- ・胃もたれ、胃痛、むかつきなどの胃の不快症状を感じるようになってきた方
- ・昔のような食べ方や飲み方ができなくなり、加齢による胃の衰えを感じる方
- ・少ししか食べていないのにお腹がはった感じがする方
- ・朝起きた時などに、胃が重苦しく感じる方

## ■ 製品概要

製品名：キャベジンコーワαプラス 第2類医薬品

成分・分量（1日量：6錠中）：

成 分		分 量
胃粘膜修復剤	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	150.0mg
制酸剤	炭酸水素ナトリウム	600.0mg
	水酸化マグネシウム	210.0mg
	沈降炭酸カルシウム	1340.0mg
	ロートエキス3倍散 〔ロートエキスとして〕	90.0mg 〔30.0mg〕
健胃生薬	ソヨウ乾燥エキス 〔ソヨウとして〕	20.0mg 〔180.0mg〕
	コウボク乾燥エキス 〔コウボクとして〕	15.0mg 〔180.0mg〕
	センブリ末	30.0mg
消化酵素剤	ビオチアスターゼ2000	24.0mg
	リパーゼAP12	15.0mg

効能・効果：

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

用法・用量：

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	2錠	1日3回
8歳以上15歳未満	1錠	
8歳未満の小児	× 服用しないこと	

包装：18錠、100錠、200錠、300錠

希望小売価格：オープン価格

取扱い店舗：全国のドラッグストア・薬局・薬店など